

Auftrag Serologie



IfM GmbH & Co. KG * Institut für Milchuntersuchung * Marie-Curie-Straße 8 * 27283 Verden * Tel: 04231/98950 *
 Fax: 04231/989540 * Mail: serologie@milchuntersuchung.de * Internet: www.milchuntersuchung.de

Nr. Probe	Ohrmarke mind. die letzten 5 Stellen	Tierkennzeichnung (Name / Stall Nr.)	TU ¹	MAP ²	Bemerkungen
			Bitte ankreuzen	Bitte ankreuzen	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Wichtige Hinweise zur TU-Milchprobenahme:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Die Untersuchung ist <u>ab dem 28. Tag</u> nach der Belegung als Erstuntersuchung möglich. Als Bestätigungsuntersuchung sollte ein <u>Abstand von mind. 20 Tagen nach der TU</u> eingehalten werden. Die 1. Wahl sind verschleppungsfrei manuell entnommene Proben. Für die Entnahme der Einzelmilchproben <u>muss</u> das Vorgemelk verworfen werden. Dies sind die ersten 3-4 Strahlen des Gemelks. Proberöhrchen <u>mind. zu ¾ mit Milch</u> füllen. Eine Probe eines Viertels je Tier ist ausreichend (keine Mischprobe aus 4 Vierteln erforderlich). | <ul style="list-style-type: none"> Diese Probe muss im Gegensatz zu einer Mastitiserregerprobe nicht steril genommen werden. Es können die gleichen Röhrchen wie für die Mastitiserregeruntersuchung (konserviert) verwendet werden. Proberöhrchen beschriften (1,2,3...) und Begleitschein vollständig ausfüllen. Konservierungsmittel mischen, Proben kühl lagern und umgehend (Post, Tankwagen, Milchkontrolleur) zum Labor weiterleiten. Proberöhrchen, Etiketten und Begleitscheine werden durch die IfM gestellt. Für die Zusendung neuer Röhrchen und Begleitscheine <p>bitte hier ankreuzen: <input type="checkbox"/> Milch <input type="checkbox"/> Blut.</p> <p>Wir senden Ihnen umgehend neue Röhrchen zu.</p> |
|--|---|

¹ Trächtigkeitserforschung

² Nachweis von Antikörpern gegen Mycobacterium avium spp paratuberculosis (MAP)